05-OCT-2007 2007-4897

Mise à jour 25-FÉV-2011 2011-1069

PARTIE 1

Premier panneau:

Plantskydd®

Répulsif chevreuil

Poudre soluble concentrée

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARANTIE: sang desséché.....99,84 %

ENREGISTREMENT NO. 27411 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Fabriqué aux ÉTATS-UNIS

Plantskydd™ repousse par son odeur*
SANS DANGER pour les opérateurs antiparasitaires ou les planteurs

POIDS NET: 1 kg

Efficace contre les chevreuils pendant 2 à 4 mois.

- distribué par -

logo **Tree World®**

4466 Stalashen Drive

Sechelt (Colombie-Britannique)
Canada V0N 3A0

Tél.: (604) 885-3535

Pour passer une commande - appel sans frais (Amérique du Nord) **tél/fax:**

Deuxième panneau:

DIRECTIVES D'UTILISATION:
Utiliser sur le cèdre, le sapin, le pin er les semis d'épinette pour prévenir les dommages causés par le broutage du chevreuil. Le produit doit être appliqué une ou deux fois par année selon l'importance du broutage par le chevreuil.

PRÉPARATION:
1. Dissoudre 1 kg de poudre dans 5 litres d'eau tiède (10 kg = 50 litres).
2. **Important** - Laisser dissoudre pendant 20 minutes.
3. Verser le mélange liquide dans un pulvérisateur à pression en le faisant passer par un filtre à mailles fines. *(Utiliser les modèles de vaporisateurs à main ou à dos, tels que CooperPegler/Hardi™ ou SOLO™ modèles N° 485 ou N° 485 avec une buse à jet pinceau).
   Remarque: • Pour éviter l'obstruction, enlever les filtres fins internes.

DOSAGE:
Tremper - on peut traiter environ 500 à 600 semis (catégorie 1 + 0 ou 2 + 0) en « trempant » les arbres dans une solution composée de 1 kg de Plantskydd™ et de 5 litres d'eau.
Vaporiser - on peut traiter environ 350 - 450 arbres (2-4 ans) en pulvérisant une solution composée de 1 kg de Plantskydd™ et de 5 litres d'eau.

Remarque: • Ne pas augmenter les dosages indiquées ci-dessus.
• Tremper ou vaporiser surtout la partie supérieure de la plante jusqu'à ce qu'elle soit mouillée.

PÉRIODE DE TRAITEMENT:
1 Pour obtenir de meilleurs résultats - appliquer tard en automne (pour le broutage d'hiver) ou tôt au printemps.
Remarque: • Il peut y avoir un risque de noircissement des aiguilles après la vaporisation.
2. Après une pluie, attendre de 1 à 2 heures - jusqu'à ce que les aiguilles soient sèches.
3. Les températures élevées (c.à-d. de juin à août) réduisent l'efficacité du produit.
4. Traiter le **pin** avant ou après, mais pas pendant la période des nouvelles pousses.

PRÉCAUTIONS:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Ne pas entreposer la solution liquide.
1. Ne pas avaler la poudre ou la solution liquide. Se laver les mains avant de manger.
2. Pour une bonne hygiène de travail, porte des pantalons longs, des chemises à manches longues et des gants résistants aux produits chimiques pendant le mélange, le chargement, la

pulvérisation, le nettoyage et les réparations.

PREMIERS SOINS:
En cas de contact avec la peau: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau àpetites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

INFORMATION TOXICOLOGIQUE:
Traiter les symptômes.

IMPORTANT:
1. Ne pas fermer la boîte pendant que les semis sont traités.
2. Rincer le récipient, le vaporisateur, le sac, les gants, les vêtements de pluie, etc. après chaque usage.

ÉLIMINATION:
I) Rincer complètement le récipient vide.
II) Éviter de rincer ou de vider le récipient/vaporisateur à proximité de voies d'eau.
III) Respecter les directives provinciales pour tout autre besoin supplémentaire de nettoyage du récipient avant son élimination.
IV) S'assurer qu'il sera impossible de se servir du récipient vide pour tout autre utilisation.
V) Se débarrasser du récipient conformément aux exigences provinciales.
VI) Pour toute information sur l'élimination du produit non utilisé ou non nécessaire, communiquer avec le fabricant ou l'organisme provincial de réglementation. Communiquer avec le fabricant et l'organisme de réglementation provincial en cas de déversement accidentel et pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR:
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

****

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))